

Elevada eficácia, confiança e flexibilidade

Amplo espectro no controlo de pragas na horticultura...



Um planeta,
seis compromissos
para 2020

the
good
growth
plan

- Tornar as culturas mais eficientes
- Recuperar mais terras cultiváveis
- Promover a biodiversidade
- Capacitar pequenos agricultores
- Promover a segurança das pessoas
- Cuidar de cada trabalhador

www.goodgrowthplan.com



syngenta



Syngenta Crop Protection Lda

Av. D. João II Torre Fernão Magalhães, 1.1702 11º Piso
1990-084 Lisboa - Portugal
www.syngenta.pt



TM



**Elevada eficácia,
confiança e flexibilidade**


Insecticida sistémico com acção de contacto e de ingestão.

Modo de Acção

O **Eforia**® é um insecticida foliar com acção de contacto e ingestão composto por duas substâncias activas: a lambda-cialotrina, que pertence ao grupo dos piretróides e o tiametoxame, que pertence ao grupo dos neonicotinóides.

A lambda-cialotrina actua na modulação dos canais de sódio (Na+) presentes no sistema nervoso das pragas, o que lhes confere um rápido efeito de choque. Actua sobre ovos, larvas e adultos. Possui uma acção repulsiva que evita a reinfestação de insectos após a aplicação.


O tiametoxame actua também no sistema nervoso dos insectos (antagonista dos receptores nicotínicos da acetilcolina), mas com um ponto de acção diferente dos piretróides. É rapidamente absorvido pelos tecidos verdes e translocado pelo xilema – sistemias ascendente. Controla partes da planta não tratadas e novos crescimentos.



Formulação / Composição:

Mistura de suspensão de cápsulas (ZC) contendo 15 g/L ou 1,46% (p/p) de lambda-cialotrina e suspensão concentrada contendo 30 g/L ou 2,91% (p/p) de tiametoxame. Contém o formulante "1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona".

Embalagens: 1 Litro.



- Controlo de multiplas pragas: Amplo espectro de eficácia.
- Controlo de todos os estados das pragas: ovos, larvas e adultos.
- **Rápida acção de choque e prolongada protecção: por contacto, ingestão e repelencia.**
- Dupla protecção da planta: por cobertura externa e protecção sistémica interna.
- **Duplo modo de acção: para aumentar eficacia e evitar resistências.**

Finalidades / Condições de aplicação

Cultura	Praga	Dose (l/ha) Concentração (ml/hl)	Recomendações	Intervalo de Segurança (dias)
Alface e semelhantes: Alface-de-Cordeiro, Chicória, Agrião-mouro, Agrião-de-sequeiro, Rúcula (ar livre)	Afídeos (<i>Acyrtosiphon lactucae</i> ; <i>Aulacorthum solan</i> ; <i>Macrosiphum scariolae</i> ; <i>Myzus persicae</i> ; <i>Nazonovia ribisnigri</i>)	1 l/ha	Aplicar no início da infestação. As aplicações podem realizar-se durante todo o ciclo cultural, com início nas 2 folhas verdadeiras. Não realizar mais de 2 aplicações por ciclo cultural com este produto, ou com outros com os mesmos modos de acção.	7
Couve-brócolo (ar livre)	Afídeos (<i>Aphis sp</i> ; <i>Myzus persicae</i> ; <i>Brevicoryne brassicae</i>) Lagartas (<i>Pieris brassicae</i> ; <i>Helicoverpa armigera</i> ; <i>Spodoptera exigua</i> ; <i>Spodoptera littoralis</i>)	1l/ha	Aplicar no início da infestação. As aplicações podem realizar-se durante todo o ciclo cultural, com início nas 2 folhas verdadeiras até à colheita. Não realizar mais de 2 aplicações por ciclo cultural com este produto, ou com outros com os mesmos modos de acção.	10
Tomateiro (ar livre)	Lagarta (<i>Helicoverpa armigera</i>) Mosca branca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1-1.25l/ha	Aplicar no início da infestação. Utilizar a dose mais elevada em situações de alta pressão da praga. As aplicações podem realizar-se durante todo o ciclo cultural, com início nas 4 folhas verdadeiras até à colheita. Não realizar mais de 2 aplicações por ciclo cultural com este produto, ou com outros com os mesmos modos de acção.	3
Citrinos: Laranjeiras, Limoeiros, Mandarinas	Afídeos (<i>Aphis sp</i> ; <i>Myzus persicae</i>)	100ml/hl	Aplicar apenas após a floração, no início da infestação, não ultrapassando 2L de produto por hectare. Juntar óleo de Verão a 0,25%. Não realizar mais de 2 aplicações por ciclo cultural com este produto, ou com outros com os mesmos modos de acção.	28
Courgette (ar livre)	Afídeos (<i>Aphis sp</i> ; <i>Myzus persicae</i>)	1-1.25l/ha	Aplicar apenas após a época de floração, no início da infestação. Utilizar a dose mais elevada em situações de alta pressão da praga. As aplicações podem realizar-se durante todo o ciclo cultural, com início nas 2 e 4 folhas verdadeiras, até à colheita. Não realizar mais de 2 aplicações por ciclo cultural com este produto, ou com outros com os mesmos modos de acção.	7
Melancia (ar livre)				3
Batateira	Escaravelho (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.75l/ha	Aplicar no início do aparecimento das larvas. As aplicações podem realizar-se durante todo o ciclo cultural. Não realizar mais de 2 aplicações por ciclo cultural com este produto, ou com outros com os mesmos modos de acção.	7

Perigoso para as abelhas. Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto desde 5 dias antes da floração das culturas e até ao final desta, nem aplicar o produto na presença de infestantes em floração. Não aplicar durante os períodos de presença de abelhas no campo.

