Calendário de tratamentos Pêra e Maçã

syngenta®

® 2019 Syngenta. Todos os direitos reservados.
™ ou ® são marcas comerciais de uma empresa do Grupo Syngenta.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

®

Pêra/Maçã

Cuprocol®

- **Composição:** 700 g/L (36,5% p/p) de cobre (oxicloreto).
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC).
- **Finalidade:** Moniliose (*Monilia laxa, Monilia fructigena*)*; Cancro ou néctria (*Nectria galligena*)**; Pedrado (*Venturia pirina*)*.
- **Dose:** 3300 mL/hL*; 300-400 mL/hL**.
- **Intervalo Segurança:** 7 dias.

Bion®

- **Composição:** 500 g/Kg (50% p/p) de acibenzolar-S-metilo.
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG).
- **Finalidade:** Fogo bacteriano.
- **Dose:** 15 g/hL (150-200 g/ha).
- **Nº máx. aplic./ano (mesmo grupo químico):** 6.
- **Intervalo Segurança:** Pêra: 14 dias. Maça: 7 dias.

Chorus®

- **Composição:** 50% p/p de ciprodinil.
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG).
- **Finalidade:** Pedrado.
- **Dose:** 30-50 g/hL (máx. 500 g/ha).
- **Nº máx. aplic./ano (mesmo grupo químico):** 3.
- **Intervalo Segurança:** 21 dias.

Score 250 EC®

- **Composição:** 250 g/L (23,6% p/p) de difenoconazol.
- **Formulação:** Concentrado para emulsão (EC).
- **Finalidade:** Pedrado.
- **Dose:** 15 mL/hL (máx. 150 mL/ha).
- **Nº máx. aplic./ano (mesmo grupo químico):** 3.
- **Intervalo Segurança:** 14 dias.

Geoxe®

- **Composição:** 50% p/p de fludioxonil.
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG).
- **Finalidade:** Podridões de conservação dos frutos.
- **Dose:** 0,45 kg/ha.
- **Nº máx. aplic./ano (mesmo grupo químico):** 2.
- **Intervalo Segurança:** 3 dias.

Switch®

- **Composição:** 375 g/Kg (37,5% p/p) de ciprodinil + 250 g/Kg (25% p/p) de fludioxonil.
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG).
- **Finalidade:** Maçã e pêra: Podridões de conservação dos frutos (*Botrytis spp., Penicillium, Gloeosporium spp.*); Pêra: Estenfiliose (*Stemphylium spp.*).
- **Dose:** 80-100 g/hL.
- **Nº máx. aplic./ano (mesmo grupo químico):** 2.
- **Intervalo Segurança:** Maca: 2 (intervalo de 7 a 10 dias); Pera: 2 (intervalo de 12 a 14 dias).

Insegar®

- **Composição:** 25% p/p de Fenoxicarbe.
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis em água (WG).
- **Finalidade:** Bichado*, Cochinilla de S.José**.
- **Dose:** 50-60 g/hL*, 60 g/hL + 2 L/hL de óleo parafínico**.
- **Intervalo Segurança:** 21 dias.

Affirm®

- **Composição:** 8,5 g/Kg (0,85% p/p) de emamectina (sal de benzoato).
- **Formulação:** Grânulos solúveis em água (SG).
- **Finalidade:** Bichado da fruta.
- **Dose:** 250-300 g/hL.
- **Nº máx. aplic./ano (mesmo grupo químico):** 3.
- **Intervalo Segurança:** 3 dias.

Voliam Targo®

- **Composição:** 18 g/L (1,7% p/p) de abamectina + 45 g/L (4,3% p/p) de clorantraniliprol.
- **Formulação:** Suspensão concentrada (SC).
- **Finalidade:** Pêra e maçã: Bichado da fruta e Aranhiço (vermelho e amarelo); Bichado da fruta e Mineiras. Pêra: Bichado da fruta e Psila.
- **Nº máx. aplic./ano (mesmo grupo químico):** 2.
- **Dose:** 50-75 mL/hL (máx. 750 mL/ha) + Óleo de Verão a 0.25%.
- **Intervalo Segurança:** 14 dias.

Karate Zeon®

- **Composição:** 100 g/L (9,5% p/p) de Lambda-cialotrina.
- **Formulação:** Suspensão de cápsulas (CS).
- **Finalidade:** Pêra e maçã: Bichado da fruta; Afídeos; Mosca do mediterrâneo. Pêra: Psilas.
- **Dose:** Bichado da fruta; Afídeoa; mosca do mediterrâneo: 7,5-12,5 ml/hL (75-125 mL/ha). Psilas: 20 mL/hL (200 mL/ha).
- **Nº máx. aplic./ano (mesmo grupo químico):** 2.
- **Intervalo Segurança:** 7 dias.

Costar®

- **Composição:** 850 g/kg (90000 IU/mg) de *Bacillus thuringiensis* subsp. *Kurstaki* estirpe SA-12.
- **Formulação:** Grânulos dispersíveis (WG).
- **Finalidade:** Bichado-da-fruta (*Cydia pomonella*); Hiponomeuta (*Yponomeuta malinellus*).
- **Dose:** 0,05-0,1 Kg/hL (dose máxima 1,5 kg/ha).
- **Intervalo de Segurança:** N/A.

Touchdown Premium®

- **Composição:** 360 g/L (28,3% p/p) de Glifosato (sal de amónio).
- **Formulação:** Solução concentrada.
- **Finalidade:** infestantes gramíneas e dicotiledóneas.
- **Dose:** 2-7 L/ha.
- **Intervalo Segurança:** 28 dias.

syngenta®

Pêra

TRATAMENTO DE INVERNO	Cuprocol®						
FOGO BACTERIANO	Bion®	Bion®	Bion®	Bion®	Bion®	Bion®	
ESTENFILIOSE			Switch®	Switch®	Switch®	Switch®	Switch®
PEDRADO	Chorus®	Chorus®	Chorus®	Chorus®	Score 250 EC®	Score 250 EC®	Score 250 EC®
DOENÇAS CONSERVAÇÃO (PRÈ-COLHEITA)						Geoxe®	Geoxe®
BICHADO				Evure Insegar®	Insegar®	Costar® Voliam Targo® Affirm®	Affirm®
AFIDEOS					KarateZeon®	KarateZeon®	
PEDROLHO E CECIDÓMIA-DAS-FOLHAS	Evure	Evure	Evure	Evure	Evure	Evure	
COCHONILHA SÃO JOSÉ		Insegar®	Insegar®			Insegar®	
PSILA				Vertimec®	Evure Voliam Targo®	Voliam Targo®	
MOSCA DO MEDITERRÂNEO							KarateZeon®
INFESTANTES	Touchdown Premium®	Touchdown Premium®	Touchdown Premium®	Touchdown Premium®	Touchdown Premium®	Touchdown Premium®	Touchdown Premium®
NUTRIÇÃO		Isabión®	Isabión® Sequestrene®	Sequestrene®	Sequestrene®	Sequestrene®	StimufolK®

syngenta®

Maçã





TRATAMENTO DE INVERNO	Cuprocol®						
FOGO BACTERIANO	Bion®						
PEDRADO		Chorus®			Score 250 EC®		
OÍDIO		Score 250 EC®					
DOENÇAS CONSERVAÇÃO (PRÈ-COLHEITA)							Geoxe®
BICHADO				Evure Insegar®	Costar® Voliam Targo®		Karate Zeon® Affirm®
AFIDEOS		Evure					Karate Zeon®
PEDROLHO E CECIDÓMIA-DAS-FOLHAS	Evure						
COCHONILHA SÃO JOSÉ		Insegar®			Insegar®		
ÁCAROS		Vertimec®			Voliam Targo®		
MOSCA DO MEDITERRÂNEO							Karate Zeon®
INFESTANTES		Touchdown Premium®					
				Zetrola®			
NUTRIÇÃO		Isabión®				StimufolK®	

syngenta®

Boas Práticas para uma aplicação segura e efectiva

the good growth plan

- Utilize bicos anti-deriva
- Atenção às técnicas de aplicação
- Respeite os vizinhos!
- Tratamentos no momento adequeado

Para mais informações sobre deriva ou mais conselhos sobre como melhorar as suas aplicações, contacte os técnicos da Syngenta.

Syngenta Portugal.
Av. D. João II
Torre Fernão Magalhães Nº 43 -11º Piso
1990-084 Lisboa
www.syngenta.pt

www.syngenta.pt/good-growth-plan