Scaling graduations are optional. Switch off layer visibility to remove.
Please amend langauage and measurement units accordingly.

750ml

approx. measure

500ml

PRINT SUPPLIER: USE THIS FRONT PAGE FOR RIGHT HAND SITES.

250ml

- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície, de 5 metros em batateira e tomateiro e de 10 metros, com cobertura vegetal, em alcachofra, couve-brócolo, milho e milho doce.
- Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada em relação às zonas circunvizinhas, de 20 metros em tomateiro, 15 metros em batateira, 10 metros em couve-brócolo e 5 metros em alcachofra, milho e milho doce. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam pelo menos 50% de redução no arrastamento de calda durante a aplicação do produto podendo reduzir as zonas não pulverizadas em 5 metros em relação às zonas circunvizinhas.
- Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração da cultura ou na presença de infestantes em floração.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.

UFI: 4X60-A0KN-N00W-NW1U

5 600330 440146 >

Mod.: 290422 SU AGI Code: 44051

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

valorfito

L1088303 PORT/05A PPE 4160272

Ampligo®

syngenta

Inseticida foliar para controlo de afídeos e lagartas de lepidópteros no tomateiro, couve-brócolo e alcachofra; traça e escaravelho da batateira; piral, sesâmia e lagartas de lepidópteros em milho e milho doce

Suspensão de cápsulas em suspensão concentrada (ZC) com 100g/L ou 9,26% (p/p) de clorantraniliprol e 50g/L ou 4,63% (p/p) de lambda-cialotrina.

Contém: poliarilfenol fosfato etoxilado e nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com IRAC:

GRUPO	28	3	INSETICIDA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda **nº. 0836**, concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso
1990-079 LISBOA – Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e Data de produção: ver embalagem

1 Litro

Os nomes dos produtos assinalados com ®, a ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Dado o risco intrínseco do aparecimento de resistências a qualquer inseticida, recomenda-se o uso de **AMPLIGO®** segundo um programa anti-resistência que compreenda a utilização de outros inseticidas com diferentes modos de ação.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

- Nocivo por ingestão ou inalação.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- NÃO provocar o vómito.
- Recolher o produto derramado.
- Armazenar em local fechado à chave.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Tracing data is printed on booklet spine. [illegible] set vertically in both bottom corners with a white background behind them.

L1088303 PORT/05A PPE 4160272

FRONT PAGE ARTWORK MUST BE DUPLICATED IN LEFT AND RIGHT FORMAT. PRINT SUPPLIER TO REMOVE ONE FRONT PAGE ACCORDING TO SITE DESTINATION.

S-PAC	DESCRIPTION: BOOKLET 4-16 PG 275 X 122 MM - GPD	SCALE: 1:1	ISSUE NO: SYN002	ISSUE DATE: 17.03.2020	4117509	SU AGI Code: 44051

Scaling graduations are optional. Switch off layer visibility to remove.
Please amend langauage and measurement units accordingly.

- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície, de 5 metros em batateira e tomateiro e de 10 metros, com cobertura vegetal, em alcachofra, couve-brócolo, milho e milho doce.
- Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada em relação às zonas circunvizinhas, de 20 metros em tomateiro, 15 metros em batateira, 10 metros em couve-brócolo e 5 metros em alcachofra, milho e milho doce. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam pelo menos 50% de redução no arrastamento de calda durante a aplicação do produto podendo reduzir as zonas não pulverizadas em 5 metros em relação às zonas circunvizinhas.
- Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração da cultura ou na presença de infestantes em floração.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.

UFI: 4X60-A0KN-N00W-NW1U

5 600330 440146 >

Mod.: 290422 SU AGI Code: 44051

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

valorfito

L1088303 PORT/05A PPE 4160272

Ampligo®

syngenta®

Inseticida foliar para controlo de afídeos e lagartas de lepidópteros no tomateiro, couve-brócolo e alcachofra; traça e escaravelho da batateira; piral, sesâmia e lagartas de lepidópteros em milho e milho doce

Suspensão de cápsulas em suspensão concentrada (ZC) com 100g/L ou 9,26% (p/p) de clorantraniliprol e 50g/L ou 4,63% (p/p) de lambda-cialotrina.

Contém: poliarilfenol fosfato etoxilado e nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com IRAC:

GRUPO	28	3	INSETICIDA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda **nº. 0836**, concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso
1990-079 LISBOA – Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e Data de produção: ver embalagem

1 Litro

Os nomes dos produtos assinalados com ®, a ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Dado o risco intrínseco do aparecimento de resistências a qualquer inseticida, recomenda-se o uso de **AMPLIGO®** segundo um programa anti-resistência que compreenda a utilização de outros inseticidas com diferentes modos de ação.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

- Nocivo por ingestão ou inalação.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- NÃO provocar o vómito.
- Recolher o produto derramado.
- Armazenar em local fechado à chave.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Tracing data is printed on booklet spine. The PPE unit is to be set vertically in both bottom corners with a white background behind them.

L1088303 PORT/05A PPE 4160272

750ml

approx. measure

500ml

PRINT SUPPLIER: USE THIS FRONT PAGE FOR LEFT HAND SITES.

250ml

Por favor, eliminar antes de imprimir.

FRONT PAGE ARTWORK MUST BE DUPLICATED IN LEFT AND RIGHT FORMAT. PRINT SUPPLIER TO REMOVE ONE FRONT PAGE ACCORDING TO SITE DESTINATION.

S-PAC	DESCRIPTION: BOOKLET 4-16 PG 275 X 122 MM - GPD	SCALE: 1:1	ISSUE NO: SYN002	ISSUE DATE: 17.03.2020	4117509

O **AMPLIGO®** é um inseticida foliar com ação de ingestão e de contacto composto por duas substâncias ativas: o clorantraniliprol e a lambda-cialotrina. O clorantraniliprol é uma diamida antranilica (IRAC Moa 28), atua como modulador dos recetores de rianodina originando um bloqueio permanente na movimentação das lagartas. A lambda-cialotrina, é um piretróide (IRAC Moa 3) e atua como modulador do canal de sódio, interferindo ao nível do sistema nervoso central do inseto.

THESE PAGES CAN BE ADDED OR REMOVED AS NECESSARY
TO CREATE A 4, 8, 12, OR 16 PAGE BOOKLET
(INCLUDING GLUE PAGE)

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Praga	Dose (mL/ha)	Observações	Intervalo de Segurança (dias)
Tomateiro (ar livre)	**Lagarta-do-tomate** (*Helicoverpa armigera*) **Nóctuas** (*Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua*) **Traça-do-tomateiro** (*Tuta absoluta*)	400	Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento ao aparecimento das primeiras lagartas e/ou início dos estragos, desde a emergência da inflorescência até à colheita (BBCH 51-89). **Máximo de 2 tratamentos**, com 7 dias de intervalo, se as aplicações forem consecutivas.	3
	Afídeos (*Myzus persicae, Aphis gossypii Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae*)		Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento ao aparecimento da praga e/ou início dos estragos, desde a emergência da inflorescência até à colheita (BBCH 51-89). **Máximo de 2 tratamentos**, com 7 dias de intervalo, se as aplicações forem consecutivas.	
Couve-brócolo (ar livre)	**Traça-da-couve** (*Plutella xylostella*) **Nóctuas** (*Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua*) **Lagarta-da-couve** (*Pieris brassicae*) **Afídeos** (*Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysimi, Myzus persicae*)	400	Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento ao aparecimento da praga e/ou início dos estragos, desde o desenvolvimento das folhas até 10 dias antes da colheita (BBCH 12-49). **Realizar apenas 1 tratamento.**	10
Alcachofra	**Lagartas de lepidópteros** (*Chrysodeixis chalcites*) **Nóctuas** (*Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua*) **Afídeos** (*Brachycaudus cardui, Brachycaudus persicae, Macrosiphum* sp.)	300	Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento ao aparecimento da praga e/ou início dos estragos, desde o desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 12-49). **Máximo de 2 tratamentos**, com 7 dias de intervalo, se as aplicações forem consecutivas.	3

TEXT AREA
234 x 114mm
THE PENULTIMATE PAGE IS PERMANENTLY AFFIXED TO THE BOTTLE,
REPEAT LEGAL REQUIREMENTS IF NECESSARY (eg. FRONT PAGE)
IF USING A REPEAT PAGE, PLEASE SWITCH ON VISIBILITY
OF 'REPEAT PAGE' LAYER IN INDESIGN FILE

L1088303_275x122_lft.indd 2
09/05/22 15:39

Cultura	Praga	Dose (mL/ha)	Observações	Intervalo de Segurança (dias)
Batateira	**Traça-da-batata** (*Phthorimaea operculella*) **Escaravelho-da-batata** (*Leptinotarsa decemlineata*)	300	Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento ao aparecimento da praga e/ou início dos estragos, desde o desenvolvimento do caule principal até ao início da floração (BBCH 31-60). **Máximo de 2 tratamentos**, com 8-10 dias de intervalo se as aplicações forem consecutivas.	14
Milho Milho doce	**Piral-do-milho** (*Ostrinia nubilalis*) **Sesâmia** (*Sesamia nonagrioides*) **Lagarta-do-tomate** (*Helicoverpa armigera*)	300	Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência efetuar o tratamento ao aparecimento da praga e/ou início dos estragos, desde o alongamento do caule até ao fim do desenvolvimento do fruto/maçaroca (BBCH 34-77). **Máximo de 2 tratamentos**, com 7 dias de intervalo se as aplicações forem consecutivas.	14

THESE PAGES CAN BE ADDED OR REMOVED AS NECESSARY TO CREATE A 4, 6, 8 OR 10 PAGE BOOKLET (INCLUDING GLUE PAGE)

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

TEXT AREA
214 x 114 mm

MODO DE APLICAÇÃO

Para aplicação com barra de pulverização em culturas baixas:

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda.

A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

THE PENULTIMATE PAGE IS PERMANENTLY AFFIXED TO THE BOTTLE, REPEAT LEGAL REQUIREMENTS IF NECESSARY (eg. FRONT PAGE)

Para aplicação em culturas arbustivas e arbóreas:

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Volumes de calda: Alcachofra, Couve-brócolo, Tomateiro – 200 a 1000 L/ha;
Batateira – 300 a 800 L/ha; Milho e Milho doce – 300 a 600 L/ha

IF USING A REPEAT PAGE, PLEASE SWITCH ON VISIBILITY OF 'REPEAT PAGE' LAYER IN INDESIGN FILE

Retirez si vous plaît avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

L1088303_275x122_lft.indd 3 09/05/22 15:39

NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.

Por favor, eliminar antes de imprimir.

BASE

NON-PRINTABLE

Retirez si vous part avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

S-PAC	DESCRIPTION: BOOKLET 4-16 PG 275 X 122 MM - GPD	SCALE: 1:1	ISSUE NO: SYN002	ISSUE DATE: 17.03.2020	4117509

SU AGI Code: 44051