

Portugal

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Affirm

---

## Affirm



## Affirm

Ultima atualização:

03.09.2020

## Insecticida

### Proteção de culturas

**Authorisation Number:**

4029

**Pack size:**

5 kg

**Composition:**

8,5 g/kg ou 0,85% (p/p)

emamectina

**Formulation:**

Grânulos solúveis em água

Inseticida para controlo de: tuta absoluta no tomateiro, traças dos cachos na vinha, bichado em macieira, pereira e ameixeira, lagartas no tomateiro, pimenteiro, alface, beringela, couve-brócolo, couve-flor, couves de repolho, pepino, meloeiro, melancia, courgette, traça oriental e anarsia no pessegueiro e nectarina e mineira dos citrinos.

O **AFFIRM**<sup>®</sup> é um insecticida foliar com ação de ingestão e de contacto. Atua no mecanismo de contração e relaxamento muscular originando um bloqueio permanente na capacidade de movimentação: grupo 6 IRAC (ativadores dos canais de cloro). Penetra rapidamente na planta (movimento translaminar) mas não é sistémico. É rapidamente fotodegradado o que evita que seja arrastado ou lavado da superfície foliar.

## Product CP: Tabs

- [Registos](#)

- [Classificação e segurança](#)
- [Conselhos de aplicação](#)
- [Emergência](#)
- [Outro](#)

## Registos

Ameixeira

**Bichado da fruta (*Cydia funebrana*)**

<b>Dose máxima individual</b>	<b>Recomendações</b>	<b>Intervalo de segurança</b>
200 - 250 g/hL	As aplicações devem ser realizadas à eclosão das larvas da primeira geração. Utilizar a concentração mais elevada, quando a intensidade de ataque da praga seja elevada. Efetuar se necessário no máximo 3 aplicações por ciclo cultural. O intervalo mínimo entre tratamentos deve ser de 7-10 dias, alternando os tratamentos com produtos com diferentes modos de ação.	7 dias

Citrinos (Laranjeira, Limoeiro, Mandarina e Clementina)

**Mineira das folhas dos rebentos dos citrinos (*Phyllocnistis citrella*)**

<b>Dose máxima individual</b>	<b>Recomendações</b>	<b>Intervalo de segurança</b>
150 g/hL (máximo de 2 Kg/ha) + Óleo mineral	Aplicar logo que se observem os primeiros sintomas de ataque nas folhas dos rebentos novos em crescimento. Em função do grau de ataque e de crescimento dos rebentos, e na presença de novas folhas, repetir o tratamento com um intervalo de 10 a 14 dias. Dirigir a pulverização para os rebentos com folhas jovens, molhando bem as folhas ainda em desenvolvimento. Efetuar se necessário no máximo 2 aplicações por ciclo cultural. O intervalo mínimo entre tratamentos deve ser de 10-14 dias, alternando os tratamentos com produtos com diferentes modos de ação.	7 dias

Couves de repolho, Couve-flor e Couve-brócolo (ar livre)

**Traça-da-couve (*Plutella xylostella*), Lagarta-da-couve (*Pieris brassicae*), Nóctua (*Spodoptera littoralis*) e**

**Lagarta-do-tomate (*Heliothis armigera*)**

<b>Dose máxima individual</b>	<b>Recomendações</b>	<b>Intervalo de segurança</b>
1 - 1,5 Kg/ha	As aplicações podem-se realizar durante todo o ciclo cultural. Fazer a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas. Utilizar a concentração mais elevada, quando a intensidade de ataque da praga seja elevada. Efetuar se necessário no máximo 3 aplicações por ciclo cultural. O intervalo mínimo entre tratamentos deve ser de 7-10 dias, alternando os tratamentos com produtos com diferentes modos de ação.	3 dias

Pepino, Meloeiro e Melancia (ar livre e estufa)

**Nóctuas, (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis*, *Autographa gamma* e *Chrysodeixes chalcites*)**

<b>Dose máxima individual</b>	<b>Recomendações</b>	<b>Intervalo de segurança</b>
100 - 150 g/hL	As aplicações podem-se realizar durante todo o ciclo cultural. Fazer a primeira aplicação ao aparecimento das primeiras lagartas. Utilizar a concentração mais elevada, quando a intensidade de ataque da praga seja elevada. Efetuar se necessário no máximo 3 aplicações por ciclo cultural. O intervalo mínimo entre tratamentos deve ser de 7-10 dias, alternando os tratamentos com produtos com diferentes modos de ação.	3 dias

Tomateiro (ar livre e estufa)

**Traça do tomateiro (*Tuta absoluta*)**

<b>Dose máxima individual</b>	<b>Recomendações</b>	<b>Intervalo de segurança</b>
150 g/hL	As aplicações podem realizar-se durante todo o ciclo cultural, iniciando-se ao aparecimento dos primeiros adultos nas armadilhas de monitorização, seguindo-se com aplicações consecutivas, de modo a controlar, uma geração completa da praga. Efetuar se necessário no máximo 3 aplicações por ciclo cultural. O intervalo mínimo entre tratamentos deve ser 7-10 dias.	3 dias