

Portugal

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Zetaminol

Zetaminol

Zetaminol

Ultima atualização:

24.07.2019

Nutriente

Proteção de culturas

Authorisation Number:

--

Pack size:

5 kg

Composition:

6% p/p

Aminoácidos livres obtidos por fermentação bacteriana (Escherichia)

18% p/p

Azoto total (N)

1.1% p/p

Azoto orgânico

4.3% p/p

Azoto nítrico

1.0% p/p

Azoto amoniacal

11.6% p/p

Azoto ureico

11% p/p

Pentóxido de fósforo solúvel em citrato de amónio neutro e em água (P2O5)

18% p/p

Óxido de potássio (K2O)

3% p/p

Óxido de magnésio (MgO)

0,6% p/p

Boro (B)

0.08% p/p

Cobre (Cu)

0.08% p/p

Manganês (Mn)

0.08% p/p

Zinco (Zn)

Adubo com aminoácidos NPK (Mg) 18-11-18 (3) com Boro (B), Cobre (Cu), Manganês (Mn) e Zinco (Zn), para aplicação foliar e fertirrigação.

Bionutriente especial com alto teor em aminoácidos, NPK, magnésio, boro e outros oligoelementos.

pH = 3 - 5 (em solução de 1% p/p).

Intervalo de pH em que se garante uma boa estabilidade da fração quelatada: pH entre 3 e 9.

Conteúdo em aminoácidos livres (aminograma): lisina (6%)

Product CP: Tabs

- [Registos](#)
- [Classificação e segurança](#)
- [Conselhos de aplicação](#)
- [Emergência](#)

Registos

Hortícolas

Hortícolas

Dose máxima individual	Recomendações	Intervalo de segurança	Comentário
Concentração (g/100 L água): 100 g/hL	Depois da cultura ter 4 folhas, tratar de 20 em 20 dias. Aplicar a concentração indicada em 500 - 1000 L água/ha.	-	Para obter melhores qualidade e quantidade.

Vinha

Vinha

Dose máxima individual	Recomendações	Intervalo de segurança	Comentário
Concentração (g/100 L água): 100 g/hL	A partir da rebentação (8 a 10 cm) e depois da floração. Aplicar a concentração indicada em 500 - 1000 L água/ha.	-	Para diminuir as consequências do escaldão e obter uma vindima de melhor qualidade.

Classificação e segurança

Declarações de precaução

- Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
 - Manter fora do alcance das crianças.
 - Manter ao abrigo da humidade.
 - Manter o recipiente bem fechado.
 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
 - Evitar a libertação para o ambiente.
 - Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
-

Conselhos de aplicação

Modo de Preparação da calda e Utilização

Dissolva previamente a dose a utilizar de ZETAMINOL numa pequena quantidade de água, adicionando-a à cuba do pulverizador, que deverá ter a água a metade da sua capacidade. Depois, ponha em funcionamento o agitador e termine de encher a cuba com água.

Precauções / Compatibilidades

O ZETAMINOL é compatível com a maioria dos inseticidas e fungicidas que se aplicam em agricultura. Contudo, antes de cada mistura recomenda-se fazer um ensaio prévio, principalmente em ornamentais. Não juntar óleos. Em misturas com cobres, à excepção da oliveira onde não há problema, recomenda-se realizar testes prévios. Não aplicar em ameixeiras.

Emergência

- Centro de informação anti-venenos: 808 250 143
-