

Arcade

Arcade

Última atualização:

18.02.2020

Herbicida

Proteção de culturas

Authorisation Number:

00695

Pack size:

10 l

Composition:

800 g/L ou 7,681% (p/p)

Metribuzina

800 g/L ou 76,80% (p/p)

Prosulfocarbe

Formulation:

Concentrado para emulsão (EC)

Herbicida seletivo, indicado para aplicação em pré-emergência na cultura da batata, para controlo das principais infestantes anuais dicotiledóneas e algumas gramíneas.

O **ARCADE** é um herbicida sistémico, com ação residual, seletivo para a cultura da batata, formulado com base em duas substâncias ativas: prosulfocarbe e metribuzina. O prosulfocarbe pertence à família química do tiocarbamato. É absorvido por via foliar e radicular. Atua através da inibição da biossíntese dos ácidos gordos (inibindo a atividade de enzimas polimerases). A metribuzina pertence à família química das triazinonas. É predominantemente absorvido por via radicular. Atua através da inibição da fotossíntese, ao nível do fotossistema II (inibindo a atividade da proteína D1).

Product CP: Tabs

- [Registos](#)
- [Classificação e segurança](#)

- [Conselhos de aplicação](#)

- [Emergência](#)

- [Outro](#)


Filtrar por Cultura

- Qualquer - ▼

Apply

Batateira

Gramíneas: milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), erva-febra (*Lolium rigidum*), milhã verde (*Setaria viridis*). **Dicotiledóneas:** Cicuta menor (*Aethusa sp.*), erva-aranha (*Amaranthus blitoides*), bredos (*Amaranthus retroflexus*), (*Atriplex patula*), catassol (*Chenopodium album*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), (*Mercurialis annua*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), (*Polygonum convolvulus*), erva-bastarda (*Polygonum lapathifolium*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), cardo-morto (*Senecio vulgaris*), urtiga (*Urtica sp.*), pica-três (*Xanthium spinosum*).

Dose máxima individual	Volume de água	Recomendações	Intervalo de segurança
4 - 5 L/ha	200 a 400 L/ha	Época de aplicação: Pré-emergência Aplicar o produto no intervalo de tempo que decorre entre a sementeira e a emergência da cultura, e as infestantes até ao estado de 2 folhas. Utilizar a dose mais elevada em solos pesados e fortemente infestados.	Não se aplica
Classificação, rotulagem e embalagem (CRE)		<ul style="list-style-type: none">•  GHS09	
Avisos legais		ATENÇÃO	

- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Contém prossulfocarbe. Pode provocar uma reação alérgica.
- Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros, em relação às zonas circunvizinhas. Com utilização de bicos anti-deriva, a zona não pulverizada pode ser reduzida para 5 metros.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 18 metros em relação às águas de superfície.
- Armazenar na embalagem original em local seco, fresco e bem arejado. Evitar temperaturas inferiores a - 10°C e superiores a 35°C.

Declarações de precaução

Modo de Preparação da Calda e Utilização

Na preparação da calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre. Evitar deixar a calda em repouso.

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

Uma vez preparada a calda do herbicida a aplicação deve ser efetuada mediante um pulverizador com barra de aplicação para herbicidas.

A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Volume de calda a utilizar: 200 a 400 L/ha.

Após os tratamentos, lavar o material com detergente e passar várias vezes com água, depois da prévia remoção dos bicos e dos filtros que devem ser lavados separadamente.

Precauções Biológicas

Aplicar o **ARCADE** com o terreno húmido, sem torrões e com as infestantes emergidas até ao estado de 2 folhas.

Após a aplicação deve evitar-se mobilizar o terreno, por isso, a amontoa deve ser feita o mais cedo possível e só depois fazer a aplicação.

O **ARCADE** só deve ser aplicado nas culturas que se desenvolvam em condições normais de vigor e sanidade.

Não aplicar em variedades sensíveis à metribuzina.

Durante a aplicação, não atingir culturas nem terrenos vizinhos.

- **Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250**

- **Protecção Integrada**

Segundo a **Directiva do Uso Sustentável** (Directiva 2009/128/CE) que foi transposta para a **Lei nº 26/2013** (a 11 de Abril), é obrigatória a aplicação dos princípios gerais da Protecção Integrada por todos os utilizadores profissionais. Cumprindo esses princípios gerais, **todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate aos inimigos das culturas são passíveis de ser utilizados em Protecção Integrada.**

LMR

Informação relativa aos **LMRs**, consultar a informação na página oficial da EU:

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=active_substance_selection&language=EN
