

Portugal

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Almeirão-branco

---





Almeirão-branco

# CVPCA

*Crepis capillaris* (L.) Wallr.

## Dicotiledóneas anuais

### Familia

Asteraceae

#### Synonyme:

almeirôa; barba-de-falcão

Harmfulness



++

### Young

Cotiledones redondos e ovados (5 mm), pecíolo do mesmo comprimento que o limbo. Primeiras folhas inteiras, sinuosas e com os dentes espaçados. Limbos lanceolados esreitados em todo o comprimento num pecíolo.

### Adult

Porte ascendente, 15 cm a 1 metro. Caule glabro que se ramifica na sua parte mediana

Folhas: lanceoladas, sinuosas dentadas, glabras em ambos os lados, as superiores são sésseis, sagitadas: envoltentes com aurículas, sagitadas.

Inflorescência: capítulos grandes de flores amarelo - alaranjado, liguladas. Flores externas avermelhadas na página externa. Brácteas do involúcro com pêlos difusos no exterior e glabras no interior, reflexos na maturação. Frutos aquênios com espinho muito curto, crista branca de 3 a 4 mm.

## Particularities

Germinações inverniais. Pastagens, vinhas, pomares, tendência acidófila.

---