

Portugal

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Almeirôa-dos-comboios







Almeirôa-dos-comboios

CVPFO

Crepis foetida L.

Dicotiledóneas anuais

Familia

Asteraceae

Harmfulness



++

Young

Cotilédones ovados lanceolados, tamanho reduzido e pouco persistente, quase sésseis. Folhas simples, obovados, peciolados, pouco dentadas (3 a 8 apículas muitas vezes com coloração) que se estreitam progressivamente num pecíolo foliáceo.

Adult

Altura: 10 a 40 cm. Planta com roseta basal e um caule ereto, ramificado e com folhas. Grande pilosidade mais ou menos glandulosa.

Folha: com grande polimorfismo, grande risco de confusão com outras plantas do genero Crepis, principalmente no estado juvenil. Folhas com contorno poligonal, dentadas com dentes terminados em uma apícula parda-avermelhada, pecíolo foliáceo pouco distinto; superfície e margens onduladas. Inflorescência: flores amarelas em raios (liguliflora). Frutos: aquênios com cristas escabrosas e sésseis.

Particularities

Latéx ao romper-se o anel. Odor a iodo marcado quando as plantas se pisam com os pés. Abundantes nas vinhas e hortas, presente noutras cultivos invernais.
