









Tasneirinha

SENVU

Senecio vulgaris L.

Dicotiledóneas anuais

Familia

Asteraceae

Synonyme:

cardo-morto; jarilhão; tasna

Harmfulness



++

Young

Cotilédones elípticos, com ápice arredondado, mais ou menos peciolados. Folhas simples, elípticas a ovadas, regularmente dentadas.

Adult

Altura: 20 a 40 cm. Caule ereto e ramificado. Folhas: quase glabras ou pubescentes (pilosidade fina, unida, entrecruzada), penatipartidas ou penatifendidas com lóbulos iguais, estendidos, angulosos, dentados. Folhas inferiores atenuadas num pecíolo; folhas caulinares sésseis, envoltentes auriculadas. Inflorescências: flores amarelas tubulosas, em pequenos capítulos; estigamas das flores em tubo, como que cortados no ápice. Invólucro cilíndrico, glabro de folíolos com manchas negras no ápice e com um caulículo de 8 a 10 brácteas pequenas 4 vezes mais curtas. Frutos: pardo acinzentados, aquénios pubescentes.

Particularities

Planta emoliente, refrescante, utilizada contra a epilepsia, a gota e o reumatismo. Contem inulina. Frutos consumidos por aves com crias pequenas.
