

Portugal

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pt>)

[Home](#) > Cherívia





Cherívía

PAVSU

Pastinaca sativa subsp. *urens* (Req. ex Godr.) Celak.

Dicotiledóneas perenes

Familia

Apiaceae

Synonyme:

chirivia; pastinacas; pastinaga; capitães; malva-de-cheiro

Harmfulness



++

Young

Cotilédones grandes elípticos, alongados, longos pecíolos, nervuras médias visíveis. Primeiras folhas arredondadas, cordiformes, crenadas, pecíolo piloso.

Adult

Folhas: pubescentes, divididas em grandes fragmentos (3 a partir da 3ª folha e logo 5 a 7). Folíolo terminal muitas vezes trilobulado e arredondado. Bainha pouco desenvolvida, comprimida em redor do pecíolo. Caule fendido, pubescente, base simplesmente estriadas, não canelada. Inflorescências: grandes caules floríferos (até 2 m). Umbelas bastante homogéneas, umbélulas sem involúcro de brácteas na base, flores amarelas. Dimensão máxima dos raios: 4 cm. Frutos: diaquénios achatados em forma de lente, presença de nervos em faixas pardas.

Particularities

Ruderal, todos os cultivos. Odor (Folhas e raízes). Reacções dérmicas em contacto com a planta, cujos órgãos contêm cumarina: vermelhidão, ampolas e escurecimento (fotosensibilização).
