

L1081592 PORT/10Z PPE 4148463



Instrata® Elite

Fungicida

syngenta®

Fungicida sistémico, indicado para o combate da sclerotinia, fusariose, antracnose e rizoctónia em relvados

Suspensão Concentrada (SC) com 80,3 g/L ou 7,29% (p/p) de difenoconazol e 80,3 g/L ou 7,29% (p/p) de fludioxonil

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de venda nº 1133, concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda:

Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-1, 13º piso – 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e Data de Produção: ver embalagem

3 Litros

Os nomes dos produtos assinados com ®, a ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company



®

neutres e il vous plaît avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

S-PAC

DESCRIPTION:
LBL S PANEL RH/LH 120x120 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN002

ISSUE DATE:
02.02.2010

302465

SU AGI Code:
62774

Retirez s'il vous plaît avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

**BASE
NON-PRINTABLE**

DESCRIPTION:
LBL LFT BOOKLET/8 PG LH 120 X 120 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN001

ISSUE DATE:
26.01.2010

302540

**SU AGI Code:
62774**

NOTE TO SUPPLIER: REPEAT PAGE IS USED

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos anuais, no conjunto das doenças, com o **INSTRATA ELITE®** ou outro fungicida que contenha DMI ou fenilpirróf. O **INSTRATA ELITE®** não deve ser aplicado nos locais onde comecem a verificar-se quebras de eficácia após as aplicações do produto ou de outros produtos com o mesmo modo de ação existentes no mercado.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

- **Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.**
- Não respirar a nuvem de pulverização.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Contém 1,2-benzisothiazol-3-one. Pode provocar uma reação alérgica.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar, em relação às águas de superfície, em aplicações no Outono, no Inverno ou no Verão, uma zona total não pulverizada de 40 metros sendo 20 metros com cobertura vegetal e, em aplicações na Primavera, uma zona total não pulverizada de 20 metros sendo 10 metros com cobertura vegetal.
- Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
- O aplicador deverá usar luvas durante a preparação da calda e a aplicação do produto.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
- Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.
- Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef: 800 250 250

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



5 600330 440634 >

Mod.: 060721
SU AGI Code: 62774

L1081593 PORT/10Z_PPE 4148464



valorfito



Retirez s'il vous plaît l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

25 x 25 10 x 12,5

O **INSTRATA ELITE**® é um fungicida sistêmico, com base em duas substâncias ativas: o fludioxonil e o difenoconazol. O fludioxonil pertence ao grupo dos **fenilpirrol**. É um fungicida de superfície com atividade preventiva (inibe a germinação do esporo e o crescimento do tubo germinativo). O fludioxonil estimula a síntese do glicerol, um regulador da pressão osmótica intercelular dos fungos. O difenoconazol é um fungicida sistêmico, com atividade preventiva, curativa e anti-esporulante, do grupo **IBE** (inibidor da biossíntese dos esteróis) que atua na demetilação (DMI).

O **INSTRATA ELITE**® é indicado para ser utilizado em pulverização foliar, nas condições seguidamente descritas.

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Doença	Dose (L/ha)	Condições de aplicação
Relvados (campos desportivos e campos de golfe)	Sclerotinia (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>)	3 L/ha	Iniciar as aplicações preventivamente, ao aparecimento dos primeiros sintomas e quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença. Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos anuais , no conjunto das doenças, com este ou outro fungicida que contenha DMI ou fenilpirrol . Alternar o uso deste produto com outros de diferentes modos de ação. Intervalo entre tratamentos: 14 dias.
	Fusariose (<i>Microdochium nivale</i>)		
	Antracnose (<i>Colletotrichum graminicola</i>)		
	Rizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)		

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos anuais, no conjunto das doenças, com o **INSTRATA ELITE**® ou outro fungicida que contenha DMI ou fenilpirrol. O **INSTRATA ELITE**® não deve ser aplicado nos locais onde comecem a verificar-se quebras de eficácia após as aplicações do produto ou de outros produtos com o mesmo modo de ação existentes no mercado.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequada para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Para aplicação com barra de pulverização:

- Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda.
- A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.
- Recomenda-se a utilização de bicos anti-deriva, como por exemplo, os bicos Syngenta XC com tecnologia *anti-drift*, que garantem pelo menos 79% de redução no arrastamento de calda durante a aplicação do produto.
- Volume de calda: 200 a 300 L/ha.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos anuais, no conjunto das doenças, com o **INSTRATA ELITE®** ou outro fungicida que contenha DMI ou fenilpirrol. O **INSTRATA ELITE®** não deve ser aplicado nos locais onde comecem a verificar-se quebras de eficácia após as aplicações do produto ou de outros produtos com o mesmo modo de ação existentes no mercado.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Não respirar a nuvem de pulverização.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Contém 1,2-benzisothiazol-3-one. Pode provocar uma reação alérgica.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar, em relação às águas de superfície, em aplicações no Outono, no Inverno ou no Verão, uma zona total não pulverizada de 40 metros sendo 20 metros com cobertura vegetal e, em aplicações na Primavera, uma zona total não pulverizada de 20 metros sendo 10 metros com cobertura vegetal.
- Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
- O aplicador deverá usar luvas durante a preparação da calda e a aplicação do produto.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
- Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.
- Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef: 800 250 250

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



5 600330 440634 >

Mod.: 060721
SU AGI Code: 62774

L1081593 PORT/10Z PPE 4148464



Retirez s'il vous plaît avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

10 x 12,5

25 x 25

GLUE PAGE