

O FORCE é um inseticida do solo sob a forma de grânulos para aplicação ao ar livre na época da sementeira das culturas. É um inseticida piretróide de largo espectro de ação que atua essencialmente por contacto e ingestão. Possui uma pressão de vapor que permite a sua difusão no solo e uma ação residual de algumas semanas até alguns meses, assegurando uma prolongada boa eficácia do produto. A teflutrina é um piretróide que atua ao nível do sistema nervoso dos insetos, como modelador dos canais de sódio.

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com IRAC:
GRUPO 3A INSECTICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:
Aplicar em culturas ao ar livre através de um distribuidor de grânulos e com incorporação do produto no solo

CULTURAS	PRAGAS	DOSE (g/m ²)	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
APFO, ALFACE, BERINGELA	Nóctua (Agrotis sp.) Afritas (Agrotis sp.)	15-20	Aplicar antes ou durante a sementeira (BCH O) realizado apenas uma aplicação por campanha.
ERVILHEIRA, FEJÓDRO, GIRASSOL, MILHO, MILHO DOCE, TABACO, TOMATEIRO	Morcego-do-campo (Pala risosa) Melaena (Melaena melanostha)	10-15	
MELANCIA, MELÓDRO	Nóctua (Agrotis sp.) Afritas (Agrotis sp.)	15	
CENOURA	Nóctua (Agrotis sp.) Morcego-do-campo (Pala risosa) Melaena (Melaena melanostha)	10-15	
COUVE-BRÓCCO, COUVE-CHINESA, COUVE-DE-BRUXELAS, COUVE-FLOR, COUVE-ÍRMANO, COUVE-REPOLHO, NABO	Nóctua (Agrotis sp.) Afritas (Agrotis sp.) Pora-das-couveas (Caulorhynchus aurostigma) Morcego-do-campo (Pala risosa) Melaena (Melaena melanostha)	10-15	
BETERRABA SACARINA	Ataca-da-beterraba (Ceratopogon davis)	10-15	
FUNCHO	Nóctua (Agrotis sp.) Afritas (Agrotis sp.) Morcego-do-campo (Pala risosa) Melaena (Melaena melanostha)	15-20	
RABANO	Nóctua (Agrotis sp.) Afritas (Agrotis sp.) Morcego-do-campo (Pala risosa) Melaena (Melaena melanostha)	10-15	
SOJA	Nóctua (Agrotis sp.) Afritas (Agrotis sp.) Morcego-do-campo (Pala risosa) Melaena (Melaena melanostha)	12-15	
SORGO	Nóctua (Agrotis sp.) Afritas (Agrotis sp.) Morcego-do-campo (Pala risosa) Escudimela (Eurygaster integriceps)	12-15	

MODO DE APLICAÇÃO:
Distribuição dos grânulos com incorporação do produto no solo. Quando aplicado em grandes extensões, utilizar meios mecânicos - distribuidores de grânulos a microgrânulos. Para cálculo do débito das máquinas informa-se que a densidade do produto é 0,8.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:
ATENÇÃO
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P101 Se for necessário consultar um médico, mostre a embalagem ou rótulo.
P261 Evitar respirar a névoa de pulverização.
P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P280 Usar luvas e vestuário de proteção.

Mod.: 180221
SU AGI Code: 69453

P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão sem esfregar.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P391 Recolher o produto derramado.
P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de: 10 m incluindo de coberto vegetal para couve-brócolo, couve-flor, couve-de-bruxelas, couve-repolho, alface, beringela, tomateiro, melancia, melão; 10 m com cobertura vegetal ou 20 m sem cobertura em cenoura, rabano, nabo, couve-rábano, funcho, alpo; 10 m para feijoeiro com vagem, beterraba sacarina, girassol, tabaco, soja; 5 m para milho: milho doce, sorgo e ervilheira.
- Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m em relação às zonas não cultivadas.
- Para proteção das aves e dos mamíferos selvagens, incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.
- Para proteção das abelhas, não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto. Não aplicar este produto na presença de insetantes em floração. Não aplicar 10 dias antes da floração.
- Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos, Telef.: 800 250 250

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



00 010 1034 30



5 600330 440283 >



KEEP AWAY FROM FOOD AND FEEDING STUFFS

UN3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tefluthrin)

For specialist advice
Huddersfield +44 1484 538444

L1072367 PORT/02Z PPE 4134527

Force®

syngenta®

Inseticida do solo para proteção de diversas culturas, desde a sementeira

Grânulos (G)
Teflutrina: 0,5% (p/p)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda n.º 1752, concedida pela DGAV

Títular da autorização de venda:
ADAMA Portugal Lda
Av. Defensores de Chaves nº15 - 5.ºB
1000-109 Lisboa
Tel: 217 166 861

Distribuído por:
Syngenta Crop Protection - Soluções para a Agricultura, Lda
Av. D. João II - Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-1, 13.º Piso - 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00
www.syngenta.pt

Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Data de produção e Lote n.º: (ver impresso)

UFI: 8C43-90DP-6001-6CNS

10 Kg

Os nomes dos produtos assinalados com ®, a ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company

THE 1MM WHITE SPACES ARE ADAPTABLE DEPENDING ON PRINT TOLERANCES, BUT SHOULD NOT EXCEED 4MM. THERE SHOULD NOT BE MORE THAN 1MM OF OVERLAP BETWEEN COLOURS