

Condições de utilização e restrições, respeitantes a todas as finalidades:

Aplicar em relvado recém-semeados apenas de Março a Maio e em relvados estabelecidos de Março a Setembro.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Para evitar qualquer risco de fitotoxicidade em plantas cultivadas, após cada tratamento com **OVERTAKE**[®], lavar cuidadosamente o pulverizador com água e um agente molhante (recomendado para a lavagem dos pulverizadores), e em conformidade com a legislação em vigor.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

- Provoca irritação cutânea.
- Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- Provoca lesões oculares graves.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Pode provocar sonolência ou vertigens.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Evitar respirar os vapores e a nuvem de pulverização.
- Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.
- EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
- Recolher o produto derramado.
- Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
- Armazenar em local fechado à chave.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar este produto de Junho a Fevereiro em relvados recém-semeados.
- Para proteção das águas subterrâneas, não aplicar este produto de Outubro a Fevereiro em relvados estabelecidos.
- Para proteção das águas subterrâneas, não aplicar este produto de Junho a Fevereiro em relvados recém-semeados.
- Para proteção das plantas não visadas, evitar a deriva da pulverização em zonas não cultivadas adjacentes.
- Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
- O aplicador deverá usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda; luvas, vestuário de proteção adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
- Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef.: 800 250 250

UFI: X990-T030-0004-8ES1

Mod. 061022
SU AGI Code: 76636

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela Ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



16 x 16
10 x 12,5

L1099131 PORT/01B



Overtake[®]

Herbicida

syngenta[®]

Herbicida de pós-emergência para o controlo de infestantes dicotiledóneas em relvados

Suspo-emulsão (SE) com 98 g/L ou 9,76% (p/p) de fluroxipir (na forma de éster metilheptílico) e 2,45 g/L ou 0,24% (p/p) de florasulame

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com HRAC:

GRUPO 2 | 4 | HERBICIDA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda n.º 2039, concedida pela DGA.V.

Titular da Autorização de Venda: GLOBACHEM NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019 – 3800 Sint-Truiden – Belgium
0032 11 78 57 17

Distribuído por:

Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ld[®]
Avenida D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, n.º 9-1, 13.º Piso – 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 / www.syngenta.pt

Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e Data de produção: ver embalagem

1 Litro

Os nomes dos produtos assinalados com a ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company

O **OVERTAKE**[®] é um herbicida sistémico, com absorção foliar e radicular, formulado com base nas substâncias ativas florasulame e fluroxipir. O florasulame pertence à família química das triazolopirimidinas (grupo HRAC 2), tem uma translocação rápida no apoplasto e simplasto até às zonas meristemáticas, atuando por inibição da enzima acetolactato sintase (ALS), indispensável à síntese dos aminoácidos leucina, isoleucina e valina. O fluroxipir, pertencente ao grupo químico dos piridiloxicarboxilatos, sendo uma auxina sintética (grupo HRAC 4), também apresenta translocação através do simplasto e do apoplasto com acumulação nos tecidos meristemáticos, inibindo o desenvolvimento celular (ataca como o ácido indolacético, IAA).

UTILIZAÇÃO, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Zonas	Dose (L/ha)	Condições de aplicação
Relvados	Relvados desportivos, ornamentais ou residenciais.	1,5 – 1,8	Aplicar em relvados de graminéas recém-semeados ou já estabelecidos, com as infestantes em crescimento ativo, de preferência nos primeiros estados de desenvolvimento. Aplicar a dose mais baixa em relvados de graminéas recém-semeados (a partir do BBCH12) e a dose mais elevada em relvados de graminéas estabelecidos. Efetuar no máximo 1 aplicação por ano. Evite qualquer contato com as folhas das plantas cultivadas. As infestantes dicotiledóneas não presentes no momento de aplicação não são controladas. O OVERTAKE [®] pode ser aplicado em todos os tipos de solo.
	Relvados para produção de tapetes de relva.		

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

amor-de-hortelão (*Galium aparine*); camomila (*Matricaria chamomilla*); margaça (*Tripleurospermum inodorum*); língua-de-ovella (*Plantago lanceolata*); botão-de-ouro (*Ranunculus repens*); labaga-crespa (*Rumex crispus*); dente-de-leão (*Taraxacum officinale*); trevo-branco (*Trifolium repens*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

bolsa-do-pastor (*Capsella bursa-pastoris*); morugem-branca (*Stellaria media*); amor-perfeito (*Viola arvensis*).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Não aplicar **OVERTAKE**[®] se o relvado estiver molhado. Entre a aplicação de **OVERTAKE**[®] e a sementeira de relvados deverá decorrer um intervalo de quatro semanas. Se o relvado estiver sobre o efeito de stress devido ao frio, seca, danos causados por pragas ou deficiência de nutrientes não aplicar **OVERTAKE**[®].
- Evitar cortar o relvado três dias antes e após a pulverização para garantir a presença de superfície suficiente das folhas das infestantes e para permitir a absorção e o movimento de **OVERTAKE**[®] no interior das infestantes.
- Restos de corte de infestantes tratados com **OVERTAKE**[®], podem ser usados em mulchs com segurança após o terceiro corte.
- Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar **OVERTAKE**[®] ou qualquer outro que contenha substâncias ativas das mesmas famílias químicas durante mais de três anos seguidos.
- Recomenda-se proceder à rotação de culturas sempre que possível e a alternância com herbicidas de diferente modo de ação.

PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos antiarrastamento.

Volume de calda a utilizar: 120 a 400 L/ha.



5 600330 441389 >

SU AGI Code: 76636