


**Advion<sup>®</sup> Baratas**

O produto Advion<sup>®</sup> Gel Baratas é um inseticida isco em gel pronto a usar, para o controlo de baratas, incluindo: Barata oriental ou comum (*Blatta orientalis*); Barata alemã ou loira (*Blatta germanica*); Barata americana (*Periplaneta americana*).

### Formulação / Composição

Inseticida em isco na forma de gel, pronto a usar, com 0,6% (p/p) de indoxacarbe e 100% (p/p) de excipientes c.s.p.  
Grupo Químico: Oxadiazina

### Modo de Acção

O produto **Advion<sup>®</sup> Gel Baratas** foi desenvolvido para o controlo de pragas de baratas, e é eficaz contra insetos adultos e em estado de ninfa. O pequeno atraso na mortalidade causado pela substância ativa, indoxacarbe, permite que as baratas que consumiram o isco regressem ao ninho, contaminando assim outras baratas e promovendo como resultado, uma significativa redução no nível de infestação.

### Áreas de Aplicação

Para uso exclusivo como inseticida.

Para ser aplicado, **exclusivamente por profissionais**, em tratamento local dos cantos e fendas exteriores, interiores e em torno das residências, instalações industriais, escritórios, armazéns, cozinhas industriais, hospitais, escolas, centros geriátricos, hotéis, autocarros, comboios, aeronaves e estabelecimentos comerciais e de retalho.

#### 1. Uso interior

- As áreas infestadas devem ser cuidadosamente inspecionadas para determinar o grau de infestação, a localização dos ninhos e os pontos de aplicação mais adequados.
- O **Advion<sup>®</sup> Gel Baratas**, deve ser aplicado em áreas frequentadas por baratas, como locais entre os materiais de construção, cavidades entre os equipamentos e o piso, acessos às cavidades e espaços vazios no piso, paredes, tetos, ao redor de tubagens, portas e janelas e por debaixo ou atrás de eletrodomésticos, cabinas, pias, armários e qualquer outro equipamento onde se saiba que as baratas podem esconder-se.
- Nas áreas dos estabelecimentos de manuseio de alimentos/alimentação a aplicação será feita apenas em cantos ou em fendas.

#### 2. Uso exterior

- Uma inspeção cuidadosa em torno da estrutura deve revelar os pontos de acesso das baratas e esses acessos devem ser bloqueados.
- O **Advion<sup>®</sup> Gel Baratas** deve ser aplicado nos locais de entrada da praga como em volta das portas e janelas, entre os materiais de construção, ou em lugares que possam servir como ninhos de baratas.
- Quando usado ao ar livre, certifique-se que o produto é aplicado em áreas que não serão molhadas por lavagem ou por água da chuva.

| Situação   | Praga  | Dose de aplicação <sup>(1)</sup>  | Observações   |
|--|--|---|---|
| <b>Uso Interior</b><br>Para ser aplicado em cantos e fendas e em torno das residências, instalações industriais, escritórios, armazéns, cozinhas industriais, hospitais, escolas, centros geriátricos, hotéis, autocarros, | Condições normais ou onde a Barata alemã ou loira ( <i>Blattella germanica</i> ) predomine.                                  | Aplicar um mínimo de <b>2 gotas de gel por m<sup>2</sup></b> .  | • O <b>Advion<sup>®</sup> Gel Baratas</b> deve ser aplicado na forma de pequenas gotas ou alternativamente em pequenas linhas de gel.<br><br>• Pequenas aplicações distribuídas dentro de |
|  | Condições de grande infestação de baratas, condições de extrema sujidade ou em presença do predomínio das baratas americanas | Aplicar pelo menos <b>2 gotas de gel por m<sup>2</sup></b> , aumentando o número de gotas até <b>5 por m<sup>2</sup></b> em condições de grande |   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>comboios, aeronaves e estabelecimentos comerciais e de retalho ou em lugares que possam servir como ninhos de baratas.</p> <p><b>Uso Exterior</b><br/>O <b>Advion® Gel Baratas</b> deve ser aplicado nos locais de entrada da praga como em volta das portas e janelas, entre os materiais de construção, ou em lugares que possam servir como ninhos de baratas.</p> | <p>(<i>Periplaneta americana</i>) e oriental (<i>Blatta orientalis</i>).</p> | <p>infestação ou de extrema sujidade.</p> | <p>uma área são mais eficientes que 1 ou 2 aplicações de grandes quantidades.</p> |
|--|--|---|---|

- (1) uma gota com 5 mm de diâmetro pesa cerca de 0,1 g  
 uma gota com 10 mm de diâmetro pesa cerca de 0,5 g  
 uma linha de 5 cm de comprimento e 3 mm de largura pesa cerca de 0,35 g

3. O **Advion® Gel Baratas** deve ser aplicado em zonas inacessíveis a crianças, animais de estimação, organismos não visados e insetos benéficos.
4. O **Advion® Gel Baratas** também pode ser colocado dentro de estações de isco aprovadas, ou dispositivos semelhantes, para garantir que o produto não esteja ao alcance de crianças ou animais de companhia. Tais dispositivos devem ser colocados nas áreas onde as baratas estejam ativas.
5. Evite aplicar **Advion® Gel Baratas** em superfícies tratadas recentemente com inseticidas repelentes de ação residual.
6. Nas áreas onde o produto tenha sido aplicado não se devem aplicar inseticidas repelentes de ação residual.
7. Os locais onde os iscos foram colocados devem ser inspecionados periodicamente para verificar o consumo e voltar a aplicar o produto se necessário.
8. Não aplicar na proximidade (dentro ou à volta) de sistemas de drenagem exteriores.
9. Não aplicar em áreas onde os alimentos e rações, utensílios para alimentação/alimentos ou superfícies de processamento de alimentos podem entrar em contacto com, ou ser contaminados pelo produto.
10. Não aplicar o produto em superfícies onde a temperatura possa ultrapassar os 50°C, pois o gel pode liquidificar e perder a eficiência (exemplos dessas superfícies, ainda que não sejam as únicas, são: a parte da zona de aquecimento em cozinhas e estufas, fornos, lareiras, ventiladores, saunas, aquecedores, frigideiras, máquinas de lavar louça e tubagens de água quente).

### Modo de Utilização

- Para aplicar o gel, retire a tampa do bico, aproxime o bico da superfície a tratar, prima lentamente o êmbolo até que a quantidade necessária do gel seja depositada. Coloque a tampa no dispensador quando o tratamento estiver concluído.
- Limpe os respingos ou excesso do produto no final da aplicação com uma toalha de papel e elimine a toalha de papel utilizada dentro de contentores apropriados para a destruição e, posteriormente, eliminados de forma segura.

- Não encher novamente ou reutilizar a seringa do isco de gel.
- As seringas vazias devem ser colocadas dentro de contentores apropriados para a destruição e, posteriormente, eliminados de forma segura.
- O produto não utilizado deve ser eliminado de forma adequada e não deve ser lançado em sistemas de drenagem.
- Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
- Armazenar o produto em local apenas acessível a pessoal autorizado, na embalagem original, corretamente etiquetado, em local trancado à chave, fresco e seco, evitando os extremos de temperatura.

**Informação sobre a gestão de resistência dos insetos:**

- A fim de minimizar o risco da resistência dos insetos (tanto fisiológica como de comportamento), é recomendável que o produto Advion Gel Baratas, não seja aplicado só.
- Este produto deve ser usado como parte de um programa de erradicação que utilize produtos que contenham uma substância ativa com um modo de ação diferente do indoxacarbe, substância ativa do produto Advion Gel Baratas.
- A Syngenta não assume nenhuma responsabilidade por qualquer perda que possa resultar da falha do produto Advion Gel Baratas no controlo de insetos resistentes.

**Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com IRAC:**

|       |    |            |
|-------|----|------------|
| GRUPO | 22 | INSETICIDA |
|-------|----|------------|

**Precauções**

- **Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.**
- **Contém indoxacarbe. Pode provocar uma reação alérgica.**
- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo/embalagem num local adequado à recolha de resíduos perigosos.

**Recomendações em caso de intoxicação ou acidente:**
**Primeiros socorros:**

- Retire a pessoa da área contaminada.
- Tire a roupa manchada ou salpicada.
- Lave os olhos com água em abundância durante pelo menos 15 minutos.
- Não se esqueça de retirar as lentes de contacto.
- Lave a pele com água em abundância e sabão, sem esfregar.
- Não administrar por via oral.
- Em caso de intoxicação, NÃO provoque o vômito. Enxague a boca com água.
- Mantenha o paciente em repouso.
- Conserve a temperatura corporal.
- Controle a respiração. Se for necessário, faça respiração boca a boca.
- Leve a pessoa intoxicada a um centro hospitalar, e sempre que possível leve o rótulo da embalagem.

**NUNCA DEIXE A PESSOA INTOXICADA SÓ.**

**Conselhos terapêuticos para médicos e equipa médica: Tratamento sintomático.**

**EM CASO DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV). Telefone: 800 250 250**

**Prazo de Validade:**

2 anos a partir da data de fabricação (ver seringa).

NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO: PT/DGS mrs-137/2022

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA  
ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM.**

**FT: 270923**