



O produto Advion® Gel Formigas é um inseticida isco em gel pronto a usar para o controlo de formigas, incluindo: Formiga preta do jardim (*Lasius niger*), Formiga faraó (*Monomorium pharaonis*), Formiga argentina (*Linepithema humile*), Formiga fantasma (*Tapinoma malenocephalum*), *Paratrechina longicornis*, *Pheidole megacephala*, *Myrmica rubra*, *Crematogaster* spp, *Tetramorium* spp e *Camponotus* spp.

Formulação / Composição

Inseticida em isco na forma de gel, pronto a usar, com 0,05 % (p/p) de indoxacarbe.
Grupo Químico: Oxadiazina

Modo de Acção

O **Advion® Gel Formigas** é formulado especificamente para ser atrativo para uma vasta gama de espécies de formigas. O **Advion® Gel Formigas** contém a substância ativa indoxacarbe, um poderoso e não-repelente inseticida. O ligeiro atraso na mortalidade causada pelo indoxacarbe, incentiva as formigas a consumir o isco e a voltarem aos ninhos e contaminarem as outras formigas, resultando numa redução significativa nos níveis de infestação. Através de trofilaxia, as formigas partilham o isco com os membros reprodutores da colónia, conduzindo à morte da rainha e eliminação completa da infestação. O uso de **Advion® Gel Formigas** vai ajudar a eliminar as formigas alguns dias após a aplicação do gel de acordo com as instruções do rótulo.

Áreas de Aplicação

Para uso exclusivo como inseticida.

Para ser aplicado por **aplicadores profissionais** para o controlo de formigas em tratamento localizado em cantos e fendas no interior e exterior de residências, instalações industriais, escritórios, armazéns, cozinhas industriais, hospitais, escolas, centros geriátricos, hotéis, autocarros, comboios, aeronaves e estabelecimentos comerciais e de retalho para a manutenção da higiene humana.

1. Uso interior

- O **Advion® Gel Formigas** deve ser aplicado em zonas inacessíveis a crianças e animais de estimação.
- As áreas infestadas devem ser cuidadosamente inspecionadas para determinar o grau de infestação, locais de alimentação e os pontos de aplicação mais adequados.
- O **Advion® Gel Formigas** pode ser aplicado no interior ou exterior, em locais de armazenamento de alimentos e rações ou outros, aplicado em tratamento localizado em cantos e fendas no interior e em torno de residências, instalações industriais, escritórios, armazéns, cozinhas industriais, hospitais, escolas, centros geriátricos, hotéis, autocarros, comboios, aeronaves e estabelecimentos comerciais e de retalho ou em locais adequados de acordo com a alimentação das formigas.
- Os locais de aplicação do **Advion® Gel Formigas** podem incluir cavidades e fendas ao longo de paredes ou pisos, atrás ou debaixo de equipamentos ou aparelhos, debaixo de mesas, em mesas ou móveis, em torno de pias, dentro ou perto de áreas de lixo, sótãos, caves e fendas em armários.
- O **Advion® Gel Formigas** também pode ser colocado dentro de estações de isco aprovadas, ou dispositivos semelhantes, para garantir que o produto não esteja ao alcance de crianças e animais de estimação. Tais dispositivos devem ser colocados junto a trilhos de alimentação das formigas ou em áreas onde as formigas estejam muito ativas.

2. Uso exterior

- O **Advion® Gel Formigas** deve ser aplicado em zonas inacessíveis a crianças, animais de estimação, organismos não visados e insetos benéficos.
- O isco deve ser coberto para assegurar que o acesso por animais não visados pelo

tratamento é minimizado.

- Não utilizar em zonas onde se sabe que um número significativo de aves se alimentam das formigas a serem tratadas, sem impedir o acesso das aves ao local.
 - Certifique-se que o produto é aplicado em áreas que não serão molhadas por lavagem ou por água da chuva. As áreas infestadas devem ser cuidadosamente inspecionadas para determinar o grau de infestação, locais de alimentação e os pontos de aplicação mais adequados. Uma inspeção cuidada em torno de uma estrutura pode revelar áreas onde as formigas estão a aceder à estrutura; devem ser feitas tentativas para impedir o acesso.
 - O **Advion® Gel Formigas** deve ser aplicado na forma de pequenas gotas ou em pequenas linhas de gel nos locais de entrada das formigas como seja ao longo de janelas, portas, entre elementos de construção, áreas de esgoto, árvores adjacentes, ao longo ou entre tijolos, ao longo das paredes, áreas com contentores de lixo ou locais que alojam ninhos de formigas.
 - O **Advion® Gel Formigas** também pode ser colocado dentro de estações de isco aprovadas, ou dispositivos semelhantes, para garantir que o produto não esteja ao alcance de crianças e animais de estimação. Tais dispositivos devem ser colocados junto a trilhos de alimentação das formigas ou em áreas onde as formigas estejam muito ativas.
3. O **Advion® Gel Formigas** deve ser aplicado na forma de pequenas gotas ou alternativamente em pequenas linhas de gel.
 4. Pequenas aplicações distribuídas dentro de uma área são mais eficientes que 1 ou 2 aplicações de grandes quantidades.
 5. Evite aplicar **Advion® Gel Formigas** em superfícies pulverizadas recentemente com inseticidas repelentes de ação residual.
 6. Nas áreas onde o **Advion® Gel Formigas** tenha sido aplicado não devem ser pulverizadas com inseticidas repelentes de ação residual.
 7. Os locais onde o isco foi colocado devem ser inspecionados periodicamente para verificar o consumo a capacidade de atração e voltar a aplicar o produto se necessário.

Modo de Utilização:

- Para ser utilizado apenas como inseticida.
- Para ser aplicado apenas por aplicadores profissionais.
- Para uso em residências e edifícios residenciais, instalações comerciais e industriais, edifícios públicos e institucionais e meios de transporte.
- Para ser usado apenas em zonas inacessíveis a crianças, animais domésticos e organismos não visados.
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas.
- Não aplicar na proximidade (dentro ou à volta) de sistemas de drenagem.
- Não aplicar em áreas onde os alimentos e rações, utensílios para alimentos ou superfícies de processamento de alimentos podem entrar em contacto com, ou ser contaminados pelo produto.
- Não aplicar em zonas de lavagem frequente pois o produto irá ser removido.
- Não aplicar o produto em superfícies onde a temperatura possa ultrapassar os 50°C, pois o gel pode liquidificar e perder a eficácia (exemplos dessas superfícies, ainda que não sejam as únicas, são: a parte da zona de aquecimento em cozinhas e estufas, fornos, lareiras, ventiladores, saunas, aquecedores, frigideiras, máquinas de lavar louça e tubagens de água quente).

- Quando usado ao ar livre, certifique-se que o produto é aplicado em áreas que não serão molhadas por lavagem ou por água da chuva.
- Limpe os pingos ou excesso do produto no final da aplicação com uma toalha de papel e elimine a toalha de papel utilizada dentro de contentores apropriados para a destruição e, posteriormente, eliminados de forma segura.
- Não utilizar em zonas onde se sabe que um número significativo de aves se alimentam das formigas a serem tratadas, sem impedir o acesso das aves ao local.
- Os locais onde os iscos foram colocados devem ser inspecionados a cada 7-14 dias para verificar o consumo e voltar a aplicar o produto se necessário.
- **Dose de aplicação:** 0,1 g/m² a 0,5 g/m².

Informação sobre a gestão de resistência dos insetos:

- As formigas são insetos sociais e as formigas que procuram alimento são todas fêmeas estéreis pelo que a necessidade de gestão da resistência é muito reduzida.
- No entanto, é recomendável que o **Advion® Gel Formigas** não seja o único produto usado num programa de eliminação de formigas.
- Este produto deve ser usado como parte de um programa de erradicação que utilize produtos que contenham uma substância ativa com um modo de ação diferente do indoxacarbe, a substância ativa do **Advion® Gel Formigas**.

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com IRAC:

GRUPO	22	INSETICIDA
-------	----	------------

Doses de Aplicação:

Aplicar um mínimo de 1 gota de gel por m² até 5 gotas de gel por m², ou uma linha de gel de 5 cm de comprimento em cada ponto de aplicação.

NOTA:

- uma gota com 5 mm de diâmetro pesa cerca de 0,1 g
- uma gota com 1 cm de diâmetro pesa cerca de 0,5 g
- uma linha de 5 cm de comprimento e 3 mm de largura pesa cerca de 0,4 g.

Para aplicar o gel, retire a tampa do bico, aproxime o bico da superfície a tratar, prima lentamente o êmbolo até que a quantidade necessária do gel seja depositada. Coloque a tampa no dispensador quando o tratamento estiver concluído.

Precauções

- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo/embalagem num local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Lave bem com água e sabão após manusear o produto.
- Armazenar na embalagem original em local fechado, bem ventilado e seco, evitando extremos de temperatura, e que seja inacessível a crianças e a pessoas estranhas.
- Manter afastado de alimentos, bebidas e rações de animais.
- Limpe os salpicos ou excesso do produto no final da aplicação com uma toalha de papel e elimine a toalha de papel juntamente com a seringa. Não recarregue ou reutilize a seringa.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV). Telefone: 800 250 250

Conselhos terapêuticos para médicos e equipa médica: Tratamento sintomático.

Prazo de Validade:

2 anos a partir da data de fabricação (ver seringa).

Número de autorização: PT/DGS mrs-117/20222

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA
ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM.**

FT: 280923